

ESG Weidmoos

Ornithologischer Bericht 2012



H. Höfelmaier

Inhaltsverzeichnis

1. Erfassungsmethoden und Ergebnis	3
2. Besonderheiten des Jahres 2012	3
3. Artenliste	4
4. Arten des Anhang I der EU Vogelschutzrichtlinie	16
5. Arten der Roten Liste Salzburgs	17
6. Anhang 1 – 6 Artkarten	18
7. Anhang 2 – zum Brutverlauf und Bruterfolg der Lachmöwe (<i>Larus ridibundus</i>) im Weidmoos	25
8. Anhang 3 – Der herbstliche Limikolenzug 2012	27
9. Anhang 4 – Silberreiher (<i>Egretta alba</i>) im Schutzgebiet und der näheren Umgebung 2012	37
– 2012 im Schutzgebiet übernachtende Bergpieper (<i>Anthus spinoletta</i>)	

Die Belegfotos in diesem Bericht stammen vom Verfasser und sind alle im Weidmoos oder in der näheren Umgebung entstanden.

Foto Seite 1: Lachmöwenkolonie

1. Erfassungsmethoden und Ergebnis

Diesem Bericht liegt keine systematische Erhebung zu Grund. Das Datenmaterial (1708 ausschließlich vom Verfasser stammende Datensätze) entstammt vielmehr aus unregelmäßigen, wenn auch häufigen, Begehungen bzw. Erfassungen vom Aussichtsturm. Diese fanden zu den unterschiedlichsten Tageszeiten statt und umfassten Großteils nur Teilbereiche des Schutzgebiets. Die zentralen Bereiche wurden, um die Störung so gering wie möglich zu halten, nicht begangen. Außerdem war mir die Begehung abseits der öffentlich zugänglichen Bereiche erst ab der 2. Maidekade möglich, was zur Folge hat, dass die Angaben, vor allem über die früh zur Brut schreitenden Brutvögel, sehr unvollständig sind.

Anmerkung des Verfassers:

Diese Art der Erfassung der Brutvögel kann ein systematisches Monitoring **nicht** ersetzen, sondern nur ergänzen.

Bei meinen Erhebungen 2012 habe ich 121 Vogelarten festgestellt, davon 50 Passeriformes und 71 Nonpasseriformes. Von 24 Arten gelangen Brutnachweise, 11 Arten sind als wahrscheinliche und weitere 14 Arten als mögliche Brutvögel einzustufen. 53 Arten waren als Durchzügler bzw. Wintergäste und 19 Arten als Nahrungsgäste zu bewerten. 23 der festgestellten Arten befinden sich im Anhang I der EU Vogelschutzrichtlinie (siehe Seite 16).

Zur Erhebung der Lachmöwe siehe Anhang 2.

Zu erwähnen wäre meines Erachtens noch, dass das Weidmoos nicht nur als Brut-, Rast- und Nahrungsgebiet für die Avifauna von sehr großer Bedeutung ist, sondern für bestimmte Arten wie Silberreiher, Kormoran, Bergpieper, Star etc. auch als Schlafplatz eine sehr große Rolle spielt.

2. Besonderheiten des Jahres 2012

Schwarzhalstaucher – Brutverdacht.

Silberreiher – bis zu 66 Ind.

Purpureiher – auch 2012 wieder eine Beobachtung.

Große Rohrdommel – auch 2012 wieder eine Beobachtung dieses seltenen Durchzüglers.

Brandgans – auch 2012 wieder eine Beobachtung dieses seltenen Durchzüglers.

Gänsesäger – auch 2012 wieder eine Beobachtung dieses seltenen Durchzüglers.

Seeadler – Regelmäßige Beobachtungen eines juvenilen Ex. zwischen 21. Sep. und 16. Okt.

Fischadler – 7 Beobachtungen.

Steinadler – 1 Beobachtung im zentralen Bereich des Schutzgebiets.

Raufußbussard – 2 Beobachtungen von insgesamt 3 Ind.

Limikolen – 15 verschiedene Arten.

Schwarzkopfmöwe – Brutverdacht.

Mittelmeermöwe – Erstmaliger Brutversuch dieser Art im Weidmoos.

Seidenschwanz – Erstnachweis im Weidmoos.

Kolkrabe – Erstnachweis im Weidmoos.

Fischotter – Auch 2012 wieder eine Beobachtung.

3. Artenliste

Alpenstrandläufer (*Calidris a. alpina*)

Status: Durchzügler

3 Beobachtungen von einzelnen Ind. (siehe auch Diagramm im Anhang 3).

Amsel (*Turdus merula*)

Status: Brutvogel/Jahresvogel

War ganzjährig im Schutzgebiet zu beobachten. Brutnachweis am 04.06. durch ein futtertragendes Männchen.

Bachstelze (*Motacilla alba*)

Status: Brutvogel/Durchzügler

Zu den Zugzeiten war diese Art mit bis zu 50 Ind. zu beobachten. Brutnachweis am 23.07. durch fütternden Altvogel.

Baumfalke (*Falco subbuteo*)

Status: Nahrungsgast

1 Beobachtung am 25.08.

Baumpieper (*Anthus trivialis*)

Status: wahrscheinlicher Brutvogel

2 Reviere im Nordteil des Schutzgebiets (siehe auch Artkarte im Anhang 1).

Bekassine (*Gallinago gallinago*)

Status: Durchzügler

Außerbrutzeitliche Beobachtungen von 11.03. bis 01.04. und von 06.07. bis 16.11. von bis zu 20 Ind. (siehe auch Diagramm im Anhang 3)

Bergfink (*Fringilla montifringilla*)

Status: Durchzügler

1 Beobachtung von 2 Ind. am 10.11.

Bergpieper (*Anthus s. spinoletta*)

Status: Durchzügler/Wintergast

Bis 04.04. und ab 10.10 versammelten sich bis zu 60 Ind. an den Schlafplätzen im Schutzgebiet (siehe auch Diagramm im Anhang 4).

Blässhuhn (*Fulica atra*)

Status: Brutvogel

7-9 Brutpaare mit insgesamt 16 nachgewiesenen Jungen.

Blauehlchen (weißsternig) (*Luscinia svecica cyanecula*)

Status: Brutvogel

Min. 7 Reviere. Brutnachweis am 07.07. durch 1 flüggen Jungvogel (siehe auch Artkarte im Anhang 1).



Blaumeise (*Parus caeruleus*)

Status: wahrscheinlicher Brutvogel/Jahresvogel

War ganzjährig im Schutzgebiet zu beobachten.

Brandgans (*Tadorna tadorna*)

Status: Durchzügler

1 Beobachtung am 09.07.

Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)

Status: Durchzügler

1 Beobachtung von 1 Ind. am 29.08.

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)

Status: Durchzügler

45 Beobachtungen zwischen 28.04. und 03.09. von bis zu 26 Ind. (siehe auch Diagramm im Anhang 3).

Buchfink (*Fringilla coelebs*)

Status: wahrscheinlicher Brutvogel/Jahresvogel

War ganzjährig im Schutzgebiet zu beobachten. Im Winter vor allem an den jagdlichen Fütterungsplätzen mit bis zu 50 Ind.

Buntspecht (*Dendrocopos major*)

Status: Brutvogel/Jahresvogel

War ganzjährig im Schutzgebiet zu beobachten. Brutnachweis durch einen Futter tragenden Altvogel am 27.05.

Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*)

Status: möglicher Brutvogel

1 Sänger am 26.05.

Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*)

Status: Durchzügler

6 Beobachtungen zwischen 03.04. und 14.09. von bis zu 5 Ind. (siehe auch Diagramm im Anhang 3).

Eichelhäher (*Garrulus glandarius*)

Status: möglicher Brutvogel

War ganzjährig im Schutzgebiet zu beobachten.

Eisvogel (*Alcedo atthis*)

Status: Durchzügler

6 Beobachtungen von einzelnen Ind. zwischen 23.07. und 16.10.

Elster (*Pica pica*)

Status: möglicher Brutvogel

War ganzjährig im Schutzgebiet zu beobachten.

Erlenzeisig (*Carduelis spinus*)

Status: Durchzügler

6 Beobachtungen von bis zu 50 Ind.

Feldschwirl (*Locustella naevia*)

Status: wahrscheinlicher Brutvogel

4 Reviere im Schutzgebiet (siehe auch Artkarte im Anhang 1).

Feldsperling (*Passer montanus*)

Status: wahrscheinlicher Brutvogel/Jahresvogel

War ganzjährig im Schutzgebiet zu beobachten. Im Winterhalbjahr zeitweise über 100 Ind. im Bereich von jagdlichen Fütterungsplätzen im NW des Schutzgebiet.

Fischadler (*Pandion haliaetus*)

Status: Durchzügler

2 Frühjahrs und 5 Herbstbeobachtungen.



Fitislaubsänger (*Phylloscopus trochilus*)

Status: Brutvogel

Häufiger Brutvogel. Brutnachweis am 08.06. durch einen Futter tragenden Altvogel.

Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*)

Status: Durchzügler

9 Beobachtungen zwischen 12.07. und 21.08. von bis zu 5 Ind. (siehe auch Diagramm im Anhang 3).

Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*)

Status: Durchzügler

12 Beobachtungen zwischen 12.07. und 05.09. von 1-2 Ind. (siehe auch Diagramm im Anhang 3).

Gänsesäger (*Mergus merganser*)

Status: Durchzügler

1 Beobachtung am 06.03. von 3 Ind. (♂, ♀♀)

Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula*)

Status: Durchzügler/Wintergast

Regelmäßige Beobachtungen ab 28.08. von bis zu 10 Individuen. Darunter min. 3 Ex. der nordischen Unterart *P. p. pyrrhula* (Trompetergimpel).

Goldammer (*Emberiza citrinella*)

Status: Brutvogel/Jahresvogel

Diese Art war das ganze Jahr über zahlreich (bis zu 46 Ind.) vor allem in den Bereichen der jagdlichen Fütterungsplätzen anzutreffen. Brutnachweise durch mehrmaliger Beobachtung Futter tragender Altvögel.

Graugans (*Anser anser*)

Status: Brutvogel/Nahrungsgast

2012 min. 10 Brutpaare mit zusammen 38 nachgewiesenen Jungen. Außerhalb der Brutzeit waren Trupps mit bis zu 92 Ind. im Schutzgebiet zu beobachten.

Graureiher (*Ardea cinerea*)

Status: Nahrungsgast/Jahresvogel

War ganzjährig mit bis zu 14 Ind. im Schutzgebiet zu beobachten.

Grauschnäpper (*Muscicapa striata*)

Status: Brutvogel

2 Brutpaare mit insgesamt min. 6 Jungen.

Große Rohrdommel (*Botaurus stellaris*)

Status: Durchzügler

1 Beobachtung von 1 Ind. am 08.11.

Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)

Status: Nahrungsgast

16 Beobachtungen von 27.03. bis 30.07. von bis zu 14 Ind. (siehe auch Diagramm im Anhang 3).

Grünschenkel (*Tringa nebularia*)

Status: Durchzügler

16 Beobachtungen von 26.05. bis 20.09. von bis zu 4 Ind. (siehe auch Diagramm im Anhang 3).

Grünfink (*Carduelis chloris*)

Status: möglicher Brutvogel

War ganzjährig im Schutzgebiet zu beobachten.

Grünspecht (*Picus viridis*)

Status: möglicher Brutvogel

War regelmäßig, auch zur Brutzeit, im Schutzgebiet zu beobachten.

Habicht (*Accipiter gentilis*)

Status: Nahrungsgast/Brutvogel der Umgebung

13 Beobachtungen von ad. und juv. Ind. im Schutzgebiet und der näheren Umgebung.



Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*)

Status: möglicher Brutvogel

1 Sänger am 01.04.

Höckerschwan (*Cygnus olor*)

Status: Durchzügler

25 Beobachtungen von bis zu 4 ad. und juv. Ind.

Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)

Status: Durchzügler

15 Beobachtungen von 04.03. bis 21.08. von bis zu 68 Ind. im Schutzgebiet und den angrenzenden Wiesen (siehe auch Diagramm im Anhang 3).

Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

Status: Brutvogel/Durchzügler

Min. 11 Brutpaare im Schutzgebiet mit insgesamt 19 nachgewiesenen Jungen. Außerhalb der Brutzeit waren Trupps mit bis zu 90 Ind. im Schutzgebiet zu beobachten (siehe auch Diagramm im Anhang 3).

Kleiber (*Sitta europaea*)

Status: Brutvogel

Brutnachweis durch einen Futter tragenden Altvogel am 10.05. am NO-Rand des Schutzgebiets.

Knäkente (*Anas querquedula*)

Status: Durchzügler

30 Beobachtungen zu den Zugzeiten von bis zu 13 Ind.

Kohlmeise (*Parus major*)

Status: wahrscheinlicher Brutvogel/Jahresvogel

War ganzjährig im Schutzgebiet zu beobachten.

Kolbenente (*Netta rufina*)

Status: Durchzügler

7 Beobachtungen von 04.04. bis 06.07. von 1-2 Ind.

Kolkrabe (*Corvus corax*)

Status: Durchzügler

1 Beobachtung am 04.04. Erstnachweis



Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

Status: Nahrungsgast/Durchzügler

Ganzjährig 65 Beobachtungen von bis zu 23 Ind.

Kornweihe (*Circus cyaneus*)

Status: Durchzügler/Wintergast

27 Beobachtungen von bis zu 4 Ind. von Jahresanfang bis 16.03. und 12 Beobachtungen von bis zu 3 Ind. von 12.10. bis Jahresende.

Kranich (*Grus grus*)

Status: Durchzügler

1 März- und 1 Novemberbeobachtung von 2 bzw. 1 Ind.



Krickente (*Anas crecca*)

Status: wahrscheinlicher Brutvogel

Durchgehende Beobachtungen im Schutzgebiet von 26.02. bis 25.11. von bis zu 100 Ind.

Kuckuck (*Cuculus canorus*)

Status: wahrscheinlicher Brutvogel

Es waren zur Brutzeit mehrfach 2-3 Sanger im Schutzgebiet festzustellen.

Lachmowe (*Chroicocephalus ridibundus*)

Status: Brutvogel

Zum Brutverlauf und Bruterfolg siehe Anhang 2.

Mauersegler (*Apus apus*)

Status: Nahrungsgast/Durchzugler

Durchgehende Beobachtungen zwischen 02.05. und 15.09. von bis zu 15 Ind.

Mausebussard (*Buteo buteo*)

Status: Nahrungsgast

Ganzjahrig Beobachtungen von bis zu 16 Ind. im Schutzgebiet und dem nahen Umfeld.

Mehlschwalbe (*Delichon urbicum*)

Status: Nahrungsgast/Durchzugler

Durchgehende Beobachtungen zwischen 06.07. und 15.09. von bis zu 50 Ind.

Misteldrossel (*Turdus viscivorus*)

Status: moglicher Brutvogel

War ganzjahrig im Schutzgebiet zu beobachten. Zu den Zugzeiten mit bis zu 50 Ind.

Mittelmeermowe (*Larus michahellis*)

Status: Brutvogel

Brutversuch eines Paares im der Lachmowenkolonie.

Monchsgrasmucke (*Sylvia atricapilla*)

Status: Brutvogel

Durchgehende Brutzeitbeobachtungen. Brutnachweis durch ein warnendes Mannchen am 26.05.

Neuntoter (*Lanius collurio*)

Status: Durchzugler

9 Beobachtungen von einzelnen Vogeln zwischen 02.08. und 16.09.

Pfeifente (*Anas penelope*)

Status: Durchzugler

1 Fruhjahrs- und 4 Herbstbeobachtungen von bis zu 4 Ind.

Pirol (*Oriolus oriolus*)

Status: Durchzugler

2 Herbstbeobachtungen von 1 und 2 Ind.

Purpureiher (*Ardea purpurea*)

Status: Durchzugler

1 Beobachtung am 26.05.

Rabenkrahe (*Corvus corone corone*)

Status: moglicher Brutvogel

War ganzjahrig im Schutzgebiet mit max. 5 Ind. zu beobachten.

Raubwürger (*Lanius excubitor*)

Status: Wintergast

3 besetzte Winterreviere bis 21.03. 2 im Schutzgebiet und 1 knapp außerhalb (22 Beobachtungen) und 2 besetzte Winterreviere ab 17.09. im Schutzgebiet (29 Beobachtungen).



Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)

Status: Nahrungsgast/Durchzügler

Durchgehende Beobachtungen zwischen 08.04 und 16.10. von bis zu >100 Ind.

Raufußbussard (*Buteo lagopus*)

Status: Durchzügler

1 Frühjahrsbeobachtung von 2 Ind. und 1 Herbstbeobachtung von 1 Ind. knapp außerhalb des Schutzgebiets.



Reiherente (*Aythya fuligula*)

Status: Brutvogel

Durchgehende Beobachtungen im Schutzgebiet von 04.03. bis 02.12. von bis zu 6 Ind. Brutnachweis durch ein Junges führendes Weibchen am 14.07.

Ringeltaube (*Columba palumbus*)

Status: möglicher Brutvogel /Durchzügler

Regelmäßige Beobachtungen zwischen 19.02. und 13.10. im Schutzgebiet und der näheren Umgebung. Zu den Zugzeiten bis zu 1000 Ind.

Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*)

Status: wahrscheinlicher Brutvogel

War ganzjährig im Schutzgebiet zu beobachten. Brutverdacht durch revieranzeigende Männchen während der gesamten Brutzeit.

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

Status: Brutvogel

Zu Beginn der Brutzeit waren 2 balzende und Nistmaterial tragende Paare im Schutzgebiet zu beobachten. Es konnte aber kein Bruterfolg festgestellt werden.

Rotfußfalke (*Falco vespertinus*)

Status: Durchzügler

1 Beobachtung von 1 Ind. am 06.05.

Rotkehlchen (*Erithacus rubecula*)

Status: Brutvogel

War ganzjährig im Schutzgebiet zu beobachten. Brutnachweis durch 1 flüggen Jungvogel.

Rotmilan (*Milvus milvus*)

Status: Durchzügler

1 Beobachtung von 1 Ind. am 03.04.

Rotschenkel (*Tringa totanus*)

Status: Durchzügler

1 Frühjahrs- und 2 Herbstbeobachtungen von jeweils 1 Ind. (siehe auch Diagramm im Anhang 3).

Schafstelze (*Motacilla flava*)

Status: Durchzügler

1 Beobachtung am 03.09. von 11 Ind. in einer Wiese knapp außerhalb vom Schutzgebiet.

Schellente (*Bucephala clangula*)

Status: Durchzügler

1 Beobachtung von 1 Ind. am 04.03.



Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*)

Status: Durchzügler

1 Beobachtung von 1 Ind. am 09.09.

Schnatterente (*Anas strepera*)

Status: Durchzügler

4 Frühjahrs- und 9 Herbstbeobachtungen von bis zu 5 Ind.

Schwanzmeise (*Aegithalos caudatus*)

Status: Durchzügler

1 Frühjahrs- und 3 Herbstbeobachtungen von bis zu 22 Ind.

Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*)

Status: möglicher Brutvogel

4 Beobachtungen von 1 bzw. 2 adulten Vögeln zwischen 17.05. und 13.06.

Schwarzkehlchen (*Saxicola torquatus*)

Status: Durchzügler

3 Herbstbeobachtungen von jeweils 1 Ind.

Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*)

Status: möglicher Brutvogel

10 Beobachtungen von 1 subadulten und 2 adulten Vögeln zwischen 25.03. und 29.06.



Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

Status: Durchzügler

Je 1 Beobachtung im Juni und im September von jeweils 1 Ind.

Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)

Status: Nahrungsgast/Brutvogel der Umgebung

10 Beobachtungen zwischen 08.04. und 07.12. von 1 bis 2 Ind.

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

Status: Nahrungsgast

2 Beobachtungen im Juli von jeweils 1 Ind.

Seeadler (*Haliaeetus albicilla*)

Status: Nahrungsgast

7 Beobachtungen von 1 juv. Exemplar zwischen 21.09. und 16.10.



Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*)

Status: Durchzügler

1 Beobachtung von 1 Ind. am 31.12. Erstnachweis

Silberreiher (*Egretta alba*)

Status: Nahrungsgast/Jahresvogel

Ganzjährige Beobachtungen von bis zu 66 Ind. Am Schlafplatz im Zentrum des Schutzgebiet bis zu 50 Ind. (siehe auch Diagramm im Anhang 4).

Singdrossel (*Turdus philomelos*)

Status: wahrscheinlicher Brutvogel

War während der gesamten Brutzeit im Schutzgebiet und den angrenzenden Wäldern zu beobachten. Brutverdacht durch revieranzeigende Männchen.

Sperber (*Accipiter nisus*)

Status: Nahrungsgast/Brutvogel der Umgebung

17 Beobachtungen im Schutzgebiet von bis zu 2 Ind.

Spießente (*Anas acuta*)

Status: Durchzügler

2 Märzbeobachtungen von 1 bzw. 2 Ind.

Star (*Sturnus vulgaris*)

Status: Nahrungsgast/Brutvogel der Umgebung

Fast ganzjährige Beobachtungen. Erstbeobachtung am 25.01. von 3 Ind. An den Schlafplätzen im Schutzgebiet waren zeitweise >10000 Ind. zu beobachten.

Steinadler (*Aquila chrysaetos*)

Status: Durchzügler

1 Beobachtung von 1 imm. Ex. am 25.03.



Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*)

Status: Durchzügler

1 Beobachtung von 1 Ind. am 08.04. knapp außerhalb des Schutzgebiets.

Stockente (*Anas platyrhynchos*)

Status: Brutvogel/Jahresvogel

Sind in der gesamten eisfreien Zeit mit bis zu 200 Ind. ständig im Schutzgebiet anwesend. Brutnachweise durch 11 führende Weibchen mit insgesamt 46 nachgewiesenen Jungen.

Sumpfmeise (*Parus palustris*)

Status: möglicher Brutvogel

Mehrere Beobachtungen zur Brutzeit.

Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*)

Status: Brutvogel

21 Reviere im Schutzgebiet. Brutnachweis am 17.07. durch Futter tragenden und warnenden Altvogel. (siehe auch Artkarte im Anhang 1).

Tafelente (*Aythya ferina*)

Status: Brutvogel

18 brutzeitliche und außerbrutzeitliche Beobachtungen von bis zu 6 Ind. Brutnachweis am 31.05. durch ein 4 pulli führendes Weibchen.

Teichhuhn (*Gallinula chloropus*)

Status: Brutvogel

19 Beobachtungen zwischen 20.04. und 10.11. von bis zu 4 Ind. Brutnachweis durch 1 bzw. 3 Junge führende Altvögel am 29.06. und am 25.07.

Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*)

Status: Brutvogel

30 Reviere im Schutzgebiet. Brutnachweis am 13.07. durch 5 flügge Jungvögel samt warnenden Altvogel (siehe auch Artkarte im Anhang 1).

Temminckstrandläufer (*Calidris temminckii*)

Status: Durchzügler

2 Julibeobachtungen von je 1 Ind. (siehe auch Diagramm im Anhang 3).

Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*)

Status: Durchzügler

4 Herbstbeobachtungen im Schutzgebiet von bis zu 6 Ind.

Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*)

Status: Durchzügler

1 Beobachtung von 1 Ind. am 13.06.

Turmfalke (*Falco tinnunculus*)

Status: Nahrungsgast/Brutvogel der Umgebung

War ganzjährig im Schutzgebiet und der näheren Umgebung zu beobachten.

Uferschnepfe (*Limosa limosa*)

Status: Durchzügler

2 Frühjahrsbeobachtungen und 1 Herbstbeobachtung von bis zu 2 Ind. (siehe auch Diagramm im Anhang 3).

Uferschwalbe (*Riparia riparia*)

Status: Durchzügler

Je 1 Mai- und Septemberbeobachtung von bis zu 9 Ind.

Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*)

Status: Durchzügler

Beobachtungen zu beiden Zugzeiten von Trupps mit bis zu 250 Ind.

Wachtel (*Coturnix coturnix*)

Status: Durchzügler

1 Nachweis im Schutzgebiet am 26.05.

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)

Status: Durchzügler

31 Beobachtungen zwischen 14.03. und 05.09. von bis zu 7 Ind. (siehe auch Diagramm im Anhang 3).

Wanderfalke (*Falco peregrinus*)

Status: Nahrungsgast/Durchzügler

5 Beobachtungen im Schutzgebiet von ad. und juv. Ind.



Wasserralle (*Rallus aquaticus*)

Status: Brutvogel

36 Nachweise zwischen 14.03. und 13.11. Brutnachweise durch 3 führende Altvögel mit insgesamt 7 nachgewiesenen Jungen.

Weißbartseeschwalbe (*Chlidonias hybrida*)

Status: Durchzügler

1 Beobachtung von 3 Ind. am 28.04.

Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

Status: Durchzügler

2 Maibeobachtungen von jeweils 1 Ind.

Wintergoldhähnchen (*Regulus regulus*)

Status: möglicher Brutvogel

Mehrere Beobachtungen in den Fichtenbeständen des Schutzgebiets.

Zaunkönig (*Troglodytes troglodytes*)

Status: möglicher Brutvogel

Mehrere Beobachtungen im Schutzgebiet.

Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*)

Status: wahrscheinlicher Brutvogel

War zwischen März und Oktober sehr häufige im Schutzgebiet zu beobachten.

Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*)

Status: Durchzügler

1 Julibeobachtung von einem Einzelvogel (siehe auch Diagramm im Anhang 3).

Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*)

Status: Brutvogel

60 Nachweise zwischen 06.03. und 24.11. Brutnachweise durch 2 führende Altvögel mit jeweils 1 Jungen und der Feststellung von insgesamt 5 Jungvögeln im Schutzgebiet.



Mittelmeermöwen

4. Arten des Anhang I der EU Vogelschutzrichtlinie

1. **Große Rohrdommel** (*Botaurus stellaris*)
2. **Silberreiher** (*Egretta alba*)
3. **Purpureiher** (*Ardea purpurea*)
4. **Fischadler** (*Pandion h. haliaetus*)
5. **Wespenbussard** (*Pernis apivorus*)
6. **Schwarzmilan** (*Milvus m. migrans*)
7. **Rotmilan** (*Milvus milvus*)
8. **Seeadler** (*Haliaeetus albicilla*)
9. **Rohrweihe** (*Circus aeruginosus*)
10. **Kornweihe** (*Circus cyaneus*)
11. **Steinadler** (*Aquila chrysaetos*)
12. **Rotfußfalke** (*Falco vespertinus*)
13. **Wanderfalke** (*Falco peregrinus*)
14. **Kranich** (*Grus grus*)
15. **Kampfläufer** (*Philomachus pugnax*)
16. **Bruchwasserläufer** (*Tringa glareola*)
17. **Schwarzkopfmöwe** (*Larus melanocephalus*)
18. **Weißbartseeschwalbe** (*Chlidonias hybrida*)
19. **Trauerseeschwalbe** (*Chlidonias niger*)
20. **Eisvogel** (*Alcedo atthis*)
21. **Schwarzspecht** (*Dryocopus martius*)
22. **Blaukehlchen** (*Luscinia svecica*)
23. **Neuntöter** (*Lanius collurio*)

5. Arten der Roten Liste Salzburgs die als gefährdet bzw. potenziell gefährdet oder als Brutvogel als ausgestorben eingestuft sind.

1. Baumfalke (<i>Falco subbuteo</i>)	VU
2. Baumpieper (<i>Anthus trivialis</i>)	NT
3. Bekassine (<i>Gallinago gallinago</i>)	CR
4. Braunkehlchen (<i>Saxicola rubetra</i>)	VU
5. Drosselrohrsänger (<i>Acrocephalus arundinaceus</i>)	CR
6. Eisvogel (<i>Alcedo atthis</i>)	CR
7. Feldschwirl (<i>Locustella naevia</i>)	VU
8. Fischadler (<i>Pandion haliaetus</i>)	RE
9. Flussregenpfeifer (<i>Charadrius dubius</i>)	CR
10. Flussuferläufer (<i>Actitis hypoleucos</i>)	EN
11. Gänsesäger (<i>Mergus merganser</i>)	CR
12. Graugans (<i>Anser anser</i>)	NT
13. Graureiher (<i>Ardea cinerea</i>)	VU
14. Grünspecht (<i>Picus viridis</i>)	NT
15. Habicht (<i>Accipiter gentilis</i>)	VU
16. Höckerschwan (<i>Cygnus olor</i>)	VU
17. Kiebitz (<i>Vanellus vanellus</i>)	VU
18. Knäkente (<i>Anas querquedula</i>)	CR
19. Krickente (<i>Anas crecca</i>)	CR
20. Neuntöter (<i>Lanius collurio</i>)	NT
21. Pirol (<i>Oriolus oriolus</i>)	EN
22. Raubwürger (<i>Lanius excubitor</i>)	RE
23. Reiherente (<i>Aythya fuligula</i>)	EN
24. Rohrammer (<i>Emberiza schoeniclus</i>)	NT
25. Rohrweihe (<i>Circus aeruginosus</i>)	CR
26. Rotschenkel (<i>Tringa totanus</i>)	RE
27. Schafstelze (<i>Motacilla flava</i>)	CR
28. Schilfrohrsänger (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>)	CR
29. Schwarzkehlchen (<i>Saxicola torquatus</i>)	VU
30. Schwarzmilan (<i>Milvus migrans</i>)	CR
31. Schwarzstorch (<i>Ciconia nigra</i>)	CR
32. Steinadler (<i>Aquila chrysaetos</i>)	NT
33. Trauerschnäpper (<i>Ficedula hypoleuca</i>)	EN
34. Uferschwalbe (<i>Riparia riparia</i>)	RE
35. Wachtel (<i>Coturnix coturnix</i>)	EN
36. Wanderfalke (<i>Falco peregrinus</i>)	VU
37. Wasserralle (<i>Rallus aquaticus</i>)	VU
38. Weißsterniges Blaukehlchen (<i>Luscinia svecica cyanecula</i>)	EN
39. Wespenbussard (<i>Pernis apivorus</i>)	VU
40. Zwergtaucher (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)	VU

RE (Regionally Extinct): Bestand erloschen
 CR (Critically Endangered): Vom Aussterben bedroht
 EN (Endangered): Stark gefährdet
 VU (Vulnerable): Gefährdet
 NT (Near Threatened): Vorwarnliste

6. Anhang 1 – 6 Artkarten

Kiebitz

BM = Brut möglich **BW** = Brut wahrscheinlich **BN** = Brut nachgewiesen  = Revierzentrum



Baumpieper




Blaukehlchen



Feldschwirl




Sumpfrohrsänger



Teichrohrsänger





Pfeifente

7. Anhang 2

ESG Weidmoos

Brutverlauf und Bruterfolg der Lachmöwe (*Larus ridibundus*) 2012



Anmerkung

Mein Bericht kann nur eine annähernde Einschätzung der Anzahl der Brutpaare und deren Bruterfolge geben.

1. Wollte ich die Störungen so gering wie möglich halten.
2. Konnte ich von meinen fünf, am Rande der Brutkolonie liegenden, Beobachtungspunkten die Kolonie nicht vollständig einsehen.

Brutbestand

Meiner Einschätzung nach hat sich die Anzahl der Brutpaare gegenüber dem Vorjahr leicht gesteigert. Nimmt man das Ergebnis der Drohnenbefliegung von 2011 als Richtwert, dürfte die Anzahl der Brutpaare heuer bei ca. 2400 – 2600 liegen.

Brutverlauf

Erste Aktivitäten im Koloniebereich konnte ich am 04. März vom Beobachtungsturm aus feststellen. Die Anfangszeit der Brutperiode, wie Nestbau, Legebeginn usw., wurde von mir noch nicht aus der Nähe kontrolliert.

Die Schlupfperiode bewegte sich von Mitte Mai bis Anfang Juli. Den ersten flüggen Jungvogel beobachtete ich am 09. Juni. Der Wegzug der ersten Flügglinge samt dazugehörigen Altvögeln setzte ab der 3. Junidekade ein. Die letzte Lachmöwe dieser Brutsaison - einen ständig rufenden Altvogel - sah ich am 02. August.

Methode zur Erfassung des Bruterfolges

Zur Schätzung des Bruterfolges habe ich insgesamt 100 Nester intensiv beobachtet und das Ergebnis auf die geschätzte Brutpaarzahl der gesamten Kolonie hochgerechnet.

Bruterfolg

Der Schlupferfolg lag zu Beginn der Schlupfperiode bei 2-3 Junge pro Nest (dies lag m.E. an den optimalen Neststandorten, die sich die vermutlich schon älteren Vögel gewählt haben) und 1-2 Junge (an den minder optimalen Neststandorten von vermutlich 1. und 2. Brütern) gegen Ende der Schlupfperiode.

Von den 100 BP hatten etwa 70 BP einen Schlupferfolg zu verzeichnen. Nimmt man im Mittel 2 Junge pro erfolgreiches BP, sind das rund 140 geschlüpfte Jungvögel/100 BP. Meiner Einschätzung nach müssten demnach um die 100 Jungvögel flügge geworden sein. Rechnet man dieses Ergebnis auf 2500 BP hoch, so ergibt das für die Kolonie in etwa 2500 flügge Jungvögel, was 1 flügger Jungvogel/BP bedeutet.

Störungen und sonstige Einflüsse


Die Witterung und der relativ konstante Wasserstand zur Brutzeit haben sich heuer positiv auf den Bruterfolg ausgewirkt. Negative Auswirkungen durch Jagd oder anderen Freizeitaktivitäten konnten meinerseits nicht festgestellt werden. Auch der Prädationsdruck auf die Kolonie dürfte sich heuer in Grenzen gehalten haben.




8. Anhang 3

ESG Weidmoos


Der herbstliche Limikolenzug 2012




Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*)




Kiebitz (*Vanellus vanellus*)




Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*)




Temminckstrandläufer (*Calidris temminckii*)




Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*)




Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)




Bekassine (*Gallinago gallinago*)




Uferschnepfe (*Limosa limosa*)




Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)




Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*)




Rotschenkel (*Tringa totanus*)




Grünschenkel (*Tringa nebularia*)




Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)



Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)



Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*)




Von Limikolen bevorzugte Rastplätze im Weidmoos




9. Anhang 4

Silberreiher (*Egretta alba*) im Schutzgebiet und der näheren Umgebung 2012



2012 im Schutzgebiet übernachtende **Bergpieper** (*Anthus spinoletta*)





Brandgans



Graugansfamilie

Verfasser:

Herbert Höfelmaier
Stellbergweg 5
A-5121 Ostermiething